Formularz cenowy **Załącznik nr 2 do SIWZ**

Pakiet nr 79

L.p	opis	cena jednostk. netto	ilość na 12 m-cy	j.m	wartość netto	Stawka VAT %	kwota VAT	wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Szew syntetyczny wchłanialny jednowłóknowy, sterylny, wykonany z polimeru poli-p-dioksanu, barwiony fioletem. Szew ulega w tkance rozkładowi przez hydrolizę na kwas 2-hydroksyetosy octowy, który jest metabolizowany w organizmie. Okres podtrzymywania do dwóch tygodni wynosi 70 do 80% wyjściowej wytrzymałości na zerwanie. Po 4 tygodniach 50 do 70% proces rozkładu szwu jest zakończony po około 30 tygodniach. Szew posiada 2 igły proste, okrągłe o długości 65mm, wykonane ze stopu stali typu Ethalloy. Grubość nici 0, długość 75 cm		48	szt						
2	Szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłókniowy, sterylny wykonany z polimeru – p – diaksonu barwiony fioletem. Szew ulega w tkance rozkładowi przez hydrolizę na czas 2 – hydroksyestowy octowy, który jest metabolizowany w organizmie okres podtrzymywania do 2 tygodni wynosi 70-80% której wytrzymałość na zerwanie po 4 tygodniach 50 – 70 % proces zerwania szwu jest zakończony po około 30 tygodniach.									
a	z igła ½ koła 40 mm okrągła wzmocnioną, grubość nici 0 długość 150 cm pętle		48	szt						
b	z igła ½ koła 36 mm okrągłą wzmocnioną, grubość nici 0 długość 150 pętle		48	szt						
c	z igła ½ koła 40 mm okrągłą wzmocnioną, grubość nici 1 długość 150 pętle		48	szt						
3	Szew synetyczny wchłanialny, wielowłóknowy, sterylny, wykonany z kwasu poliglikolorego podkładany sterylnemu stopniu, bariony. Szew ulega w tkance rozkładowi przez hydrolię na okres glikolowy. Okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 60-70 %. Okres wchłaniania 60-90 dni, Pętla laparoskopowa z aparatem USB 2/0 dł. 50 cm lub USP O dł. 50 cm.		2	szt						
RAZEM:						x			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 80

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Szew chirurgiczny, syntetyczny, jednowłóknowy, niewchłanialny wykonany z polifluorku winylydenu z igłami typu ethallox									
a	2x igła 12 mm, okrągła 3/8 koła, dł. nitki 75 cm, usp 6/0		24	sasz.						
b	2 x igła 12 mm, okrągła 3/8 koła, dł. nitki 60cm, usp 6/0		24	sasz.						
c	2 x igła 12 mm, okrągła 3/8 koła, dł. nitki 75 cm usp 5/0		24	sasz.						
d	2 x igła 12 mm, okrągła ½ koła, dł. nitki 90 cm usp 5/0		24	sasz.						
RAZEM						**x**			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 81

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłanialne monofilamentowe z poliglecaprone 25, okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni, 55% po 7 dniach, całkowity czas wchłaniania 90-120 dni, zapewniający równomierny rozkład naprężeń w szwie									
a	2/0 igła ½ koła okrągła 36 mm dł. nitki 70 cm		36	sasz.						
b	1/0 igła ½ koła okrągła 30 mm dł. nitki 70 cm		36	sasz.						
c	1/0 igła ½ koła okrągła 36 mm dł. nitki 70 cm		36	sasz.						
d	1/0 igła ½ koła okrągła 40 mm dł. nitki 70 cm		36	sasz.						
e	1 igła ½ koła okrągła 30 mm dł nitki 70 cm		36	sasz.						
f	1 igła ½ koła okrągła 36 mm dł. nitki 70 cm		36	sasz.						
RAZEM						**x**			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 82

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Szwy chirurgiczne monofilamentowe wchłanialne z polidiaksanonu okres podtrzymywania tkankowego 50 % po 6 tygodniach efektywne podtrzymywanie tkankowe ponad 2 miesiące, całkowity czas wchłaniania 180-210 dni, wysoka odporność na działanie agresywnych płynów ustrojowych.									
a	2/0 36 mm ½ kół okrągła 70 cm		72	sasz.						
b	1/0 36 mm ½ koła okrągła 70 cm		72	sasz.						
c	1/0 40 mm ½ koła okrągła 70 cm		72	sasz.						
d	1 36 mm ½ koła okrągła 70 cm		72	sasz.						
e	1 40 mm ½ koła okrągła 70 cm		72	sasz.						
RAZEM						**x**			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 83

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Szew chirurgiczny syntetyczny wchłanialny monofilamentny z kwasu poli-4-hydroksybutyratowego w kolorze fioletowym. Zdolność podtrzymywania tkankowego 100 % po 14 dniach, 70% po 42 dniach, 50 % po 90 dniach, 25 %, po 140 dniach. Całkowita absorpcja szwu po 13 miesiącach.									
a	2/0 igła ½ koła okrągła 30 mm dł nitki 150 cm		36	sasz.						
b	1/0 igła ½ koła okrągła 26 mm dł. nitki 150 cm		36	sasz.						
c	1/0 igła ½ koła okrągła 40 mm dł, nitki 150 cm pętla		36	sasz.						
2	Szew zawierający wchłanialną syntetyczną taśmę w kolorze fioletu wykonany z kwasu poliglikolowego w połączeniu z okrągłą igłą z zakończeniem tępym zapobiegającym cięciu i dewitalizacji narządów miąższowych zapewnia hemostazę i adaptację organów miąższowych. Taśma z igłą 65 mm, dł. 60 cm, szerokość taśmy 3 mm		2	op.						
RAZEM						**x**			x	x

Podpis Wykonawcy