ZPD/08/22 **ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ**

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 29 Preparaty antyseptyczne

Lp.	Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka	Nazwa asortymentu	J m	Ilość na 24 m-cy	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Gotowy do użycia roztwór ponadtlenkowy do płukania ran ostrych oraz przewlekłych. Zawierający w składzie podchloryn sodu i kwas podchlorawy w stężeniach 40 ppm. Nie wymagający wypłukiwania z ran głębokich. Możliwość stosowania do przepłukiwania jamy brzusznej, spojówki oka, tkanek takich jak więzadła i ścięgna. Dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT. Opakowanie jednostkowe 990 ml.		szt.	120							
2	Jednorazowe, do użytku zewnętrznego gaziki włókninowe do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylowym wykonane z wysokogatunkowej włókniny, niepozostawiającej włókien. W rozmiarze minimum 6 cm na 6 cm. Opakowanie 100 saszetek (50x2)		op.	600							
3	Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi barwiony, jodowoo-poli-winylo-propanolowy, szybki czas działania 15 s. Zakres działania B, Tbc, F, V. Opakowanie 1 litrowe.		szt	80							
4	Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi barwiony, jodowoo-poli-winylo-propanolowy, szybki czas działania 15 s. Zakres działania B, Tbc, F, V. Opakowanie 5 litrowe.		szt.	60							
5	Preparat do dezynfekcji skóry, śluzówek i ran, zawierający wodny roztwór PVP-jodu (10% jodu). Skuteczny wobec B, F, V (HIV, HBV, Herpes) i pierwotniaków. Opakowanie 250 ml.		szt.	50							
6	Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego na bazie chlorheksydyny, alkoholu i nadtlenku wodoru, bez zawartości jodu. Opakowanie 1 litrowe.		szt.	120							

7	Antybakteryjny, antywirusowy oraz działający na Clostridium difficile preparat w płynie na bazie kwasu podchlorowego do oczyszczania i leczenia takich ran jak: owrzodzenie w stopie cukrzycowej, wszystkie postaci owrzodzenia nóg, odleżyny, wszystkie rany ostre, takie jak skaleczenia, ugryzienia, rany szarpane, rany pękające i otarcia, **rany chirurgiczne (śródoperacyjne i pooperacyjne)** rany z odsłonięciem chrząstek, ścięgien, więzadeł lub kości,oparzenia 1 i 2 stopnia, przetoki i ropnie,jamy ciała, takie jak jama ustna, nos i uszy. Do płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Opakowanie 1 litrowe zawierające: 50 mg podchlorynu sodu, 50 mg kwasu podchlorawego		szt.	50							
RAZEM:							**x**			x	x

Podpis Wykonawcy