FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 26 Dezynfekcja rąk, skóry, błon śluzowych

Lp.	Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka	Nazwa asortymentu	J m	Ilość na 12 m-cy	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT	kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tym etanol min. 78g/100g produktu) oraz dodatkową substancję z innej grupy chemicznej (difenylol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. chirurgiczna do 3 min. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia, SARS). Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Produkt biobójczy. Opakowanie butelka 500 ml. Kompatybilny z emulsją myjącą do rąk.		szt.	200							
2	Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tym etanol min. 78g/100g produktu) oraz dodatkową substancję z innej grupy chemicznej (difenylol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. chirurgiczna do 3 min. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia, SARS). Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w jednorazowe butelki o poj. 1 litra, niezasysające powietrza z otoczenia. Kompatybilny z emulsją myjącą do rąk.		szt.	100							

3	Alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (w tym etanol min. 78g/100g produktu) oraz dodatkową substancję z innej grupy chemicznej (difenylol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. chirurgiczna do 3 min. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia, SARS). Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Produkt biobójczy. Kompatybilny z emulsją myjącą do rąk. Opakowanie jednostkowe typu eurobutelki o poj. 1 l Kompatybilny z emulsją myjącą do rąk.		szt.	250							
4	Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk Opakowanie jednostkowe – butelka 500 ml. Produkt kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rąk.		szt.	100							

5	Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk konfekcjonowany w jednorazowe butelki o poj. 1 l, niezasysające powietrza z otoczenia. Przeznaczone do dozownika na fotokomórkę. Produkt kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rąk.		szt.	100							
6	Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk. Opakowanie jednostkowe typu eurobutelki o poj. 1 l. Produkt kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rak.		opak.	200							
7	preparat w formie emulsji do pielęgnacji skóry rąk. Oparty na koncepcji wody w oleju. Nie osłabiający efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk. Zawierający tokoferol. Wolny od parabenów. Kompatybilny z preparatami do mycia i dezynfekcji rąk. Kosmetyk. Opakowanie 500 ml. W zestawie 10 pompek dozujących		op.	100							

8	Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry. Posiadający jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierający alkohol benzylowy, fenyloetylowy i tenzydy. Posiadający właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Niwelujący przykre zapachy o pH 7. Kosmetyk. Opakowanie 500 ml.		op.	80							
9	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. Opakowanie 250 ml z atomizerem.		szt	50							

10	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy.. Opakowanie 1 litrowe, każda butelka z atomizerem.		szt.	260							
11	Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy Opakowanie 250 ml z atomizerem.		szt	120							

12	Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie 1 litrowe.		szt.	60							
13	Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie 250 ml ze spryskiwaczem.		szt.	20							

14	Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy. Opakowanie 1 litrowe.		szt.	50							
15	Preparat w postaci żelu wpływający na rozluźnienie i uelastycznienie mięśni, pH 5,5 na bazie olejków eterycznych i substancji pielęgnujących skórę. Opakowanie 500 ml.		szt.	60							
16	Antybakteryjna emulsja myjąca z zawartością dichlorowodorku octenidyny i alantoiny do ciała i włosów oraz przedoperacyjnej kąpieli pacjenta, skuteczna wobec B, w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Enterococcus hirae, w czasie do 60 sek. Bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Gotowy do użycia. Opakowanie 500 ml.		szt.	80							
17	Antybakteryjny i przeciwgrzybiczy płyn do płukania jamy ustnej, na bazie octenidyny, nie zawierający alkoholu i chlorheksydyny, skuteczna eradykacja MRSA z jamy ustnej, możliwość stosowania u dzieci. Opakowanie 250 ml		szt.	50							

18	Preparat do dekontaminacji, nawilżania i oczyszczania ran w postaci żelu, bezbarwny, bezwonny i bez zawartości alkoholu, zawierający dichlorowodorek oktenidyny jako substancję czynną inaktywującą patogeny. Opakowanie 20 ml.		szt.	50							
19	Alkoholowy bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami – wskazania potwierdzone w ChPL. Preparat gotowy do użycia zawierający w składzie min. 70g/100g alkoholu oraz dichlorowodorek oktenidyny. Nie zawierający jodu, oraz chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Adeno, Herpes simplex). Produkt leczniczy. Opakowanie 250 ml z atomizerem.		szt.	20							
RAZEM:							x			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 27 Dezynfekcja i mycie narzędzi

Lp.	Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka	Nazwa asortymentu	J m	Ilość na 12 m-cy	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy

1	Preparat mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561), F(EN 14562), V(HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny. Opakowania 2l		szt.	60							
2	Preparat bezaldedehydowy bezwonny do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, inkubatorów / pozytywna opinia IMiD/ oraz endoskopów. Oparty o aktywny tlen, zawierający inhibitory korozji, środku powierzchniowo-czynne. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych Wymagana deklaracja zgodności CE. Zakres działania B, F, V, S. Opakowanie 2 kg.		szt.	3							
3	Aktywator, substancja nieżrąca do w/w preparatu poszerzająca spektrum działania Tbc i S, skracająca czas dezynfekcji . Wymagane CE. Opakowanie 2 litrowe.		szt.	3							
4	Preparat płynny, w koncentracie do wstępnego mycia sprzętu endoskopowego, narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, stosowany w niskim stężeniu 1-2%, w krótkim czasie 1-5 min, na bazie enzymów i niejonowych tenzydów nie zawierający związków powierzchniowo czynnych i fosforanów. Opakowanie 2 litrowe		szt.	25							

5	Preparat do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, giętkich i sztywnych endoskopów oraz kontenerów. Preparat można stosować do anodowanego aluminium, metali kolorowych, usuwa osad krzemianowy. Zawiera enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne o pH w roztworze roboczym 10,5. Spełnia zalecenia w zakresie ograniczenia do minimum ryzyka vCJK. . Stężenie roztworu roboczego 0,3-1%. Wyrób medyczny. Opakowanie: 5l Preparaty 5-8 wzajemnie ze sobą kompatybilne tzn. Pochodzące od tego samego producenta		szt.	20							
6	Preparat do dezynfekcji narzędzi i endoskopów giętkich .Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 50-60°C. Zawierający aldehyd glutarowy, etanol, inhibitory korozji bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, HIV, HBV, Adeno, Vaccinia), S, jaja glisty, Helicobacter pyroli w czasie do 5 minut. Bezbarwny o pH 7 w roztworze roboczym 1%. Wyrób medyczny Opakowanie 5l Preparaty 5-8 wzajemnie ze sobą kompatybilne tzn. Pochodzące od tego samego producenta		szt.	40							

7	Płynny komponent stosowany w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi, umożliwiający wysychanie bez pozostawiania plam, o właściwościach ochronnych. Kwaśny preparat o pH 1,8. Stężenie użytkowe 0,1-0,2% Skład: niejonowe zw. pow. czynne, środki ułatwiające rozpuszczanie, inhibitory korozji oraz kwasy organiczne. Opakowanie 5 litrowe Preparaty 5-8 wzajemnie ze sobą kompatybilne tzn. Pochodzące od tego samego producenta		szt.	1							
8	Preparat enzymatyczny do chemiczno-termicznego mycia maszynowego endoskopów giętkich w myjni automatycznej o pH roztworu roboczego ok. 8. Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące, etanol bez zawartości soli kwasów organicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5%. Nie wymagający neutralizacji. Wyrób medyczny. Opakowanie 5 litrowe		szt.	16							
9	Preparat dezynfekcyjny, gotowy do użycia, na bazie 2% aldehydu glutarowego przeznaczony do dezynfekcji narzędzi, endoskopoów i termolabilnego sprzętu medycznego. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio) w czasie 10 min, S do 60 min. Aktywny wobec Helikobacter pylori. Zachowujący pełną aktywność biobójczą przez okres 30 dni. Wymagane paski testowe do kontroli aktywności preparatu w pakiecie. Opakowanie 5 litrowe.		szt	40							

10	Płynny koncentrat myjąco – dezynfekcyjny, przeznaczony do manualnego oraz półautomatycznego opracowania narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, chloru oraz innych substancji tlenowych. Oparty na mieszaninie substancji z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Spektrum działania: B (EN 14561), F(EN 14562), Tbc (EN 14563), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu do 2%. Wysoka kompatybilność materiałowa wobec metali, elastomerów oraz tworzyw sztucznych potwierdzona badaniami. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 5 litrowe.		szt.	15							
11	Płynny dwukomponentowy koncentrat, na bazie kwasu nadoctowego przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz sprzętu termolabilnego. Nie zawierający aldehydów, fenoli, pochodnych amin oraz QAC. Nie wymagający dodania aktywatora ani czasu aktywacji. Możliwość sporządzenia roztworu roboczego w zimnej wodzie wodociągowej. Spektrum działania: B (EN14561), F(EN 14562), Tbc (M.terra+M.avium, EN 14563) -1%-5min. (war. brudne), V(EN 14476) – 2%-15 min. (war. brudne), S(EN 14347) 2%-5min., S(C.difficile) 2%-5 min. (war. brudne). Opakowanie 2x 100ml (koncentrat + aktywator)		szt.	50							

12	Wieloenzymatyczny preparat myjący w postaci koncentratu do manualnego mycia instrumentów medycznych i endoskopów giętkich, szczególnie bronchoskopów. Bardzo dobra tolerancja materiałowa, usuwający zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. Kompatybilny z preparatem z pozycji 11. Opakowanie - butelka 2 litrowa.		szt.	5							
13	Spray służący do ochrony i pielęgnacji wrażliwych, metalowych instrumentów, przegubów, zawiasów itp. Opakowanie 400 ml		szt.	2							
RAZEM							x			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 28 Dezynfekcja małych powierzchni i sprzętu medycznego

Lp.	Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka	Nazwa asortymentu	J m	Ilość na 12 m-cy	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy

1	Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g propanolu z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Opakowanie 250 ml z atomizerem oraz 1l z nakrętką zabezpieczoną kapslem. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie 1 litrowe ze spryskiwaczem.		szt.	100							
2	Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu wykonanego z tworzyw sztucznych nie odpornych na działanie alkoholu w tym inkubatorów i głowic USG Aplikacja w postaci pianki, Spektrum: B, F, V. Czas działania: B, F, wirusy HBV, HCV, HIV – do 5 min., Opak. Do 1l. z końcówką spieniającą		szt.	40							

3	Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA. Opak. 200szt.		szt.	60							
4	Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni. na bazie czwartorzędowych związków amonowych, amin i alkoholu. Pełne spektrum działania, łącznie z Tbc w czasie 15 min oraz spory w czasie 30 minut. Powinien nie zawierać aldehydów i fenoli, możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Opakowanie 1 litrowe z dozownikiem.		szt.	20							
5	Chlorowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Pełne spektrum działania (łącznie z Cl. Difficile) w czasie 15 min Niskie stężenie użytkowe, 1 tabletka na 1 litr wody. Preparat w postaci tabletek, po 150 szt w opakowaniu.		op.	30							

6	Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie dwutlenku chloru o działaniu grzybobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym oraz sporobójczym (łącznie z Clostridium difficile) Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Opakowanie jednostkowe w postaci saszetki do przygotowania 1litra roztworu roboczego.		szt.	100							
7	Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia oraz dezynfekcji powierzchni i wyposażenia. Pełne spektrum biobójcze i sporobójcze w 15 minut. Działanie wobec Clostridium difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do15 minut. Możliwość stosowania w obecności pacjenta oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowanie zbiorcze zawierające 200 tabletek.		szt.	5							
8	Preparat w proszku na bazie aktywnego tlenu do dezynfekcji i mycia endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych z możliwością dezynfekcji powierzchni (w tym mających kontakt z żywnością). Preparat na bazie nadwęglanu sodu oraz substancji antykorozyjnych, nie wymagający aktywatora. Możliwość przygotowania preparatu w różnych stężeniach: 2%, 1%, i 0,5 %. W każdym stężeniu wymagane spektrum: B, Tbc, F, V, S (tlenowe i beztlenowe) czas działania w stężeniu 2% do 15 minut. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Opakowanie 1 kg		szt.	5							

9	Gotowy do użycia preparat w postaci pianki, sporobójczy do dezynfekcji i mycia sprzętu oraz małych i trudnodostępnych powierzchni. Zawierający nadtlenek wodoru, etanol oraz związki powierzchniowo czynne. Pełne spektrum biobójcze, działający na spory w 15 minut. Możliwość dezynfekcji inkubatorów. Opakowanie 1 litrowe z końcówką spieniającą.		szt.	5							
10	Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B(EN 13727), F (EN 13624), S (EN 14347), S(C.difficile) do 5 min., Tbc (EN 14348), V(EN 14476) do 15 min.Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIB		szt.	10							
RAZEM:							x			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 29 Preparaty antyseptyczne

Lp.	Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka	Nazwa asortymentu	J m	Ilość na 12 m-cy	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy

1	Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, nie wykazujący działania dezynfekcyjnego; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny; opakowanie 350ml; wyrób medyczny klasy III.		szt.	25							
2	Saszetki z gazikiem jałowym nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i oczyszczania skóry oraz pielęgnacji pępka u niemowląt. Pakowane po 100 sztuk.		op.	100							
3	Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi barwiony, jodowoo-poli-winylo-propanolowy, szybki czas działania 15 s. Zakres działania B, Tbc, F, V. Opakowanie 1 litrowe.		szt	5							
4	Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi barwiony, jodowoo-poli-winylo-propanolowy, szybki czas działania 15 s. Zakres działania B, Tbc, F, V. Opakowanie 5 litrowe.		szt.	25							
5	Preparat do dezynfekcji skóry, śluzówek i ran, zawierający wodny roztwór PVP-jodu (10% jodu). Skuteczny wobec B, F, V (HIV, HBV, Herpes) i pierwotniaków. Opakowanie 250 ml.		szt.	10							
6	Płynny preparat antybakteryjny do pielęgnacji skóry narażonej na ucisk, wzmacniający i poprawiający funkcję skóry. Możliwość stosowania w przypadku istniejących już zmian. Zawierający panthanol i alantoninę, nie zawierający oleju. Opakowanie 100 ml.		szt.	20							

7	Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego na bazie chlorheksydyny, alkoholu i nadtlenku wodoru, bez zawartości jodu. Opakowanie 1 litrowe.		szt.	40							
RAZEM:							x			x	x

Podpis Wykonawcy